TESTUDO PARDALIS. *Bell.*

Printed by J. Ballantyne.

J.D.C. Sowerby del. et Lithog.

TESTUDO PARDALIS. *Bell.*

Testa flavâ, nigro asperså; scutis subcarinatis, scutorum costalium areolis propè margines superiores positis; scuto nuchali nullo, femore utroque scutis binis, magnis, conicis, aruntis.

Testudo pardalis Bell, Zool. Journ. [illegible] pp. 173, p. xiii. — Gray, Syn. Rept. p. 62.

Junior. Gray, l. c. tab. iii.

? Pallas, Nov. Spec. Quadr. e Glir. ord. p. 3. — Shaw, Gen. Zool. III, p. 321.

Habitat in Africa australi.

Mus. nostr. — Jun. in Mus. Brit.

Descriptio. *Testa* [illegible] flavi, obscure nebulosim, elongatim lineolis plurimis rotundatis variim, quarum superiores multo majores. *Scutella dorsalia* [illegible] fusca. *Corpus* longissimum, flexile, fuscum, pustulis flavescentibus, squamis minutis undique tectum. *Pedes* antici fusci, squamis magnis, lanceolatis, imbricatis, flavo, secundus, defectis. *Caudæ* longa, [illegible] *Pedes* postici fusci, squamis lutescentibus, quarum [illegible] longe lanceolatæ, [illegible] *Femora* squamis antiquis [illegible] [illegible] [illegible]